急性腸胃炎飲食原則

- 一、不需要完全禁食，除非腸胃炎嚴重到無法吃藥或進食，才暫時空腹讓發炎的腸胃暫時休息。
- 二、清淡、易消化、少量多餐。
- 三、初期飲食可以口服電解質溶液或容易消化澱粉類食物為主，例如：稀飯、米湯、清麵條、吐司、饅頭、煮熟的馬鈴薯等。
- 四、可以吃：切碎的水煮雞肉、清蒸鮮魚、蔬菜柔嫩的菜葉、蘇打餅乾、蘋果、香蕉(綠香蕉可以幫助止瀉)。
- 五、不要吃：油煎油炸、辛辣刺激食物、甜食(蛋糕/甜甜圈等)、高糖飲料(會加重腹瀉)、纖維多纖維粗的食物(竹筍、蔬菜莖梗、芹菜、鳳梨)、乳製品(牛奶、優酪乳)。
- 六、口服電解質補充液，市售的運動飲料含有較高糖份及較低電解質，不建議取代口服電解質溶液。

預約掛號與看診進度查詢

衛教天地

敬祝您早日康復
佑民醫院急診諮詢專線：
049-2358151 轉 5123

編碼：E0

衛教內容僅供參考，無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷，若有問題請向醫師諮詢。